



Buis de Chine (buxus harlandii)

Le buis de Chine est une espèce originaire d'Asie orientale. Persistant, il peut être acclimaté en extérieur en climat européen. Il s'adapte aussi assez bien à la culture en intérieur. Le buis de Chine possède des petites feuilles allongées vert sombre de 10 à 15 mm. En automne, de petites fleurs blanches apparaissent. L'écorce liégeuse est très décorative et permet d'obtenir rapidement des sujets ayant une allure vénérable.



Buis de Chine obtenu par assemblage de troncs.

Exposition

De préférence ensoleillée, mais il est préférable de le placer à mi-ombre durant les mois les plus chauds de l'année. En intérieur le buis de Chine a besoin d'être dans un endroit le plus « humide » et le plus lumineux possible. Il lui faut aussi une pièce fraîche voire non chauffée. Une véranda est parfaite. Dans tous les cas, l'arbre bénéficiera de passer les beaux jours à l'extérieur. Si vous souhaitez acclimater un buis de Chine, il faut le laisser dehors à l'automne afin qu'il « prenne » le froid progressivement en lui évitant les froids extrêmes la première saison. Un arbre non encore acclimaté placé soudainement en extérieur en hiver ne résistera pas au changement soudain.

Plage de températures :

-5°C - +30°C en extérieur,

5°C - 20°C en intérieur

Fertilisation

L'espèce est gourmande. Tous les 15 jours de mars à octobre. Tous les mois en hiver si il est maintenu à l'intérieur.

Taille et mise en forme

Maintenir la forme désirée durant la saison végétative en taillant les jets. La taille est assez fastidieuse car il faut couper entre les feuilles qui sont très petites, si l'on ne veut pas les voir jaunir à l'endroit de la coupe. La ligature est déconseillée car l'écorce est très fragile et les marques sont indélébiles. Le buis de Chine produit beaucoup de rejets à l'aisselle des branches et sur le tronc. Il faut les supprimer assez régulièrement pour conserver la vigueur et éviter les cicatrices.

Arrosage

Espèce assez résistante à la sécheresse. Laisser sécher le substrat légèrement entre les arrosages.

Rempotage

Tous les 2 ans pour les sujets jeunes, tard au printemps une fois que l'activité à bien repris, dans un mélange drainant. 30 % kanuma, 70 % pouzzolane ou pierre ponce. Le pain racinaire doit être taillé assez sévèrement car l'espèce est vigoureuse.

Maladies et parasites

Peu sujet aux attaques et maladies si ce n'est le pourrissement des racines par excès d'arrosage.



L'écorce liégeuse est très décorative.